

Cher Patient,
Votre médecin a initié un traitement par Pradaxa® (dabigatran etexilate). Pour assurer la sécurité d'utilisation de Pradaxa®, veuillez tenir compte des informations importantes qui sont jointes.

Cette carte de surveillance du patient contenant des informations importantes concernant votre traitement, gardez-la en permanence sur vous pour informer les professionnels de santé que vous prenez Pradaxa®.

Information pour les professionnels de santé concernant Pradaxa®

- Pradaxa® (dabigatran étexilate) est un anticoagulant oral qui agit par inhibition directe de la thrombine.
- En cas d'intervention chirurgicale ou toute autre intervention invasive, Pradaxa® doit être préalablement arrêté (pour plus de détails, se référer au résumé des caractéristiques du produit).
- En cas d'événement hémorragique majeur, Pradaxa® doit être arrêté immédiatement.
- Pradaxa® étant principalement éliminé par les reins, une diurèse suffisante doit être maintenue. Pradaxa® est dialysable.
- Un agent de réversion spécifique (Praxbind®) est disponible (se reporter aux Résumés des Caractéristiques du Produit de Pradaxa® et de Praxbind® pour plus de détails et de conseils sur la réversion de l'effet anticoagulant de Pradaxa®).

Octobre 2017

CARTE DE SURVEILLANCE DU PATIENT

Nom du patient:

Date de naissance (JJ MM AAAA):

Indication de l'anticoagulation:

Dose de Pradaxa®:

- Gardez toujours cette carte sur vous.
 - Assurez-vous d'utiliser toujours la dernière version.
- Veuillez compléter cette partie ou demander à votre médecin de le faire.

Information pour les patients concernant Pradaxa®

- Suivez les instructions de votre médecin pour prendre Pradaxa®.
- Pradaxa® rend votre sang moins „épais“, prévient la formation de caillots et réduit le risque de développer un accident vasculaire cérébral ou d'autres complications.
- Cependant, cela peut augmenter le risque de saignement.
- Si le saignement ne cesse pas spontanément, informez-en immédiatement votre médecin.
- En cas de saignement, veuillez contacter votre médecin avant d'arrêter de prendre Pradaxa®.
- Si vous tombez ou si vous vous blessez alors que vous êtes sous traitement, en particulier si vous vous cognez la tête, appelez immédiatement un médecin. Il peut avoir besoin de vous ausculter, car vous pouvez présenter un risque de saignement accru.
- Les signes et symptômes d'événements hémorragiques peuvent être des hématomes sur la peau, des selles noires, du sang dans les urines, des saignements de nez, etc.
- Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou toute autre intervention invasive, informez votre médecin avant l'intervention que vous prenez Pradaxa®.
- N'arrêtez pas de prendre Pradaxa® sans en parler à votre médecin.
- Prenez Pradaxa® régulièrement comme cela vous a été prescrit et n'oubliez pas de dose.
- Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez actuellement. Pradaxa® peut être pris avec ou sans aliment.
- Les gélules doivent être avalées entières avec un verre d'eau pour assurer la libération dans l'estomac. Ne pas écraser, ne pas ouvrir, ne pas mâcher et ne pas vider les granules contenues dans la gélule car cela pourrait augmenter le risque de saignement.