

Gentile Paziente,

Il medico le ha prescritto un trattamento con Pradaxa® (dabigatran etexilato). Per utilizzare Pradaxa® in modo sicuro, consideri le importanti informazioni riportate all'interno.

Poiché questa scheda contiene importanti informazioni in merito al suo trattamento la porti sempre con sé, per informare gli operatori sanitari del suo trattamento con Pradaxa®.

Pradaxa®: Informazioni per gli Operatori Sanitari

- Pradaxa® (dabigatran etexilato) è un anticoagulante orale che agisce per inibizione diretta della trombina.
- In caso di intervento chirurgico o di procedure invasive, l'assunzione di Pradaxa® deve essere preventivamente sospesa (per i dettagli vedere il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
- In caso di sanguinamento maggiore l'assunzione di Pradaxa® deve essere sospesa immediatamente.
- Poiché Pradaxa® è eliminato principalmente per via renale, deve essere mantenuta un'adeguata diuresi. Pradaxa® è dializzabile.
- È disponibile un inattivatore specifico (Praxbind®) (per dettagli e ulteriori indicazioni sull'inattivazione dell'effetto anticoagulante di Pradaxa® vedere il Riassunto delle Caratteristiche di Pradaxa® e di Praxbind®).

Ottobre 2017

SCHEDA DI INFORMAZIONE PER IL PAZIENTE

Nome del paziente:

Data di nascita (GG MM AAAA):

Indicazione per cui è utilizzato l'anticoagulante: Dosaggio di Pradaxa®:

- Porti sempre con sé questa scheda.
 - Si assicuri di utilizzare sempre l'ultima versione.
- Completate questa sezione o chieda al medico di farlo.

Pradaxa®: Informazioni per il Paziente

- Quando assume Pradaxa® segua le istruzioni del medico.
- Pradaxa® rende il suo sangue meno „viscoso“, previene la formazione di coaguli e riduce il rischio di ictus o di altre complicanze.
- Tuttavia ciò può aumentare il rischio di sanguinamento.
- In caso di episodi di sanguinamento che non cessano spontaneamente, informi immediatamente il medico.
- In caso di sanguinamento, contatti il medico prima di sospendere l'assunzione di Pradaxa®.
- Se cade o si ferisce durante il trattamento, soprattutto se prende un colpo alla testa, chiami subito il medico. Il medico può ritenere necessario visitarla perché lei può essere esposto ad un elevato rischio di sanguinamento.
- Segni e sintomi di episodi di sanguinamento possono essere ematomi della pelle, feci scure, urine rosse, sangue dal naso, ecc.
- In caso di intervento chirurgico o di procedure invasive, prima dell'intervento, informi gli operatori sanitari e il medico curante sul trattamento in corso con Pradaxa®.
- Non sospenda l'assunzione di Pradaxa® senza parlarne con il medico.
- Assuma Pradaxa® regolarmente come le è stato indicato e non salti le dosi.
- Informi il medico in merito a tutti i medicinali che sta assumendo.
- Pradaxa® può essere assunto con o senza cibo. La capsula deve essere inghiottita intera con un bicchiere d'acqua, per assicurare il rilascio a livello gastrico. Non rompere, aprire, masticare o rimuovere i granuli dalla capsula poiché può aumentare il rischio di sanguinamento.